



Proceedings of International Educators Conference

Hosted online from Rome, Italy.

Date: 25th January, 2023

ISSN: 2835-396X

Website: econferenceseries.com

YURAK -O`PKA REANIMATSIYASI O`TKAZISH QOIDALARI

Mullaboyev Sardorbek Rustamovich

Sultonova Zilola Qobuljon qizi

Munavvarov Sayidnosir Qodirxon o'g'li

Chust tibbiyot kolleji

Annotatsiya:

Yurak-o'pka reanimatsiyasi (YO'R), yurak-o'pka-miya reanimatsiyasi - bu tananing hayotiy funkisiyalarini tiklashga va uni klinik o'lim holatidan chiqarishga qaratilgan shoshilinch chora-tadbirlar majmuidir.

YO'R - 1 daqiqada ko'krak qafasining 5-6 sm chuqurligidagi, 100-120 marotaba siqilishini o'z ichiga oladi.

Reanimatolog, o'pkaning sun'iy ventilyatsiyasini ham amalga oshirishi mumkin (sun'iy nafas olish); mutaxassis bo'lman insonlar uchun esa, ko'krak qafasining faqat siqishni o'z ichiga olgan soddalashtirilgan usul tavsiya etiladi. Siqish va nafas olish nisbati kattalar uchun 30 dan 2 gacha bo'lishi kerak.

Kalit so'zlar: reanimatsiya, jonlantirish, arteriya, aorta, immobilizatsiya, massaj YO'R odatda o'z-o'zidan yurakni tiklamaydi. Uning asosiy maqsadi to'qimalarning o'limini kechiktirish uchun miya va yurakka kislorodli qonning qisman oqimini tiklashdir. Oddiy yurak ritmini tiklash uchun defibrilatsiya kerak.

Iloji boricha tezroq jabrlanuvchiga yurak massajini boshlang. Shu bilan birga, klinik o'limning uchta belgisidan ikkitasining mavjudligi - ong, nafas olish va pulsning yo'qligi - uning boshlanishi uchun yetarli ko'rsatkichdir. YO'Rning asoschisi avstriyalik shifokor Piter Safar hisoblanadi.

YO'R uchun ko'rsatmalar

- Ongning yetishmovchiligi
- Nafas yetishmovchiligi
- Qon aylanishining yetishmovchiligi (bunday vaziyatda uyqu arteriyalarida pulsni tekshirish samaraliroqdir).

Agar reanimatolog yoki reanimator (reanimatsiyani o'tkazayotgan shaxs) uyqu arteriyasidagi pulsni aniqlamagan bo'lsa (yoki uni qanday aniqlashni bilmasa), unda puls yo'qligini, ya'ni qon aylanishining to'xtashi sodir bo'lgan deb hisoblash kerak.

Yevropa reanimatsiya kengashining 2010-yildagi "Yurak-o'pka reanimatsiyasini o'tkazish bo'yicha uslubiy tavsiyalar" ga muvofiq, asosiy reanimatsiya boshlanishi uchun ko'rsatmalar faqat nafas olish va ongning yo'qligi hisoblanadi.



Proceedings of International Educators Conference

Hosted online from Rome, Italy.

Date: 25th January, 2023

ISSN: 2835-396X

Website: econferenceseries.com

YO'R uchun qarshi ko'rsatmalar

- Biologik o'limning aniq belgilarining mavjudligi.
- Hayotga mos kelmaydigan jarohatlar
- Davolab bo'lmaydigan kasalliklarning rivojlanishi.^[1]
- O'pka plevrasining shikastlanishi.

Yurak to`xtaganda o`tkaziladigan reanimatsion tadbirlar yurakni tashqi massaj qilish va sun`iy nafas oldirish bo`lib, bular bir vaqtda bajariladi. Yurakni tashqi uqalash yo`lida tush suyagining pastki №1|3 qismi kaft bilan faol bosiladi. Bunda yurak to'sh suyagi va umurtqa pog'onasi oralig'ida qisiladi va ma'lum miqdordagi yurakdagi qon tomirga haydaladi. Bunday xarakat minutiga 50-70 marta takrorlanadi va muolaja tekis katta joyda bemorni chalqancha yotqizilgan holatda o`tkaziladi. Yurakni tashqi massaj qilish qo`yidagicha ijobiy belgilari bilan aniqlanadi:

- uyqu arteriyasida tomir urushining paydo bo`lishi.
- ko'z qorachiqlarining torayishi.
- yuz terisi, tirnoqlar va lablarning qizarishi
- mustaqil nafas xarakatlarining paydo bo`lishi
- mushaklar tonusining paydo bo`lishi.
- yurakni bilvosita massaj (yopiq) qilish.

Bu usulning mohiyati shundaki, yurakning to'sh suyagi bilan umurtqa pog'onasi o`rtasida qisilish natijasida katta va kichik qon aylanish doirasining yirik tomirlariga qon haydaladi va shu tariqa qon aylanish va hayotiy muhim a'zolar funksiyasi sun`iy ravishda quvvatlanib turiladi. Bemor qattiq o'ringa chalqancha yotqiziladi , bir qo'l kafti to'sh suyagining pastki 1\3 qismiga, ikkinchi kaft birinchisining ustiga qo`yiladi, qo'llar tirsak bo`g`imlarida yozilgan bo`lishi kerak, so'ngra yordam ko'rsatayotgan odam to'shni to'rtkisimon bosib uni umurtqa pog'onasi yo`nalishi bo'yicha 3-5 sm.ga siljitishga, shu vaziyatda taxminan 1,2 sk. kutib turishga so'ngra qo'llarni to'shdan olmasdan turib, ularni tez bo'shatishga harakat qiladi.

Sun`iy nafas berish usullari

Nafas yo'llari o'tkazuvchanligini tiklash, nafas - tovush boymlarining spazmi, nafas yo'llariga qusuq massasinining tikilishi, intubatsion naychaning buralib ketishi, tilning xalqumga ketib qolishi va shu kabilar oqibatida nafas faoliyatini to'xtashi mumkin.





Proceedings of International Educators Conference

Hosted online from Rome, Italy.

Date: 25th January, 2023

ISSN: 2835-396X

Website: econferenceseries.com

Nafas yo`llari to`liq yoki qisman bekilishi mumkin. Behush holatda yotgan odamda nafas yo`llari erkin o`tkazuvchanligini tiklash uchun tez va izchillik bilan qo`yidagi tadbirlarin o`tkazish zarur:

- 1) Bemorni qattiq yuzaga chalqancha yotqizish.
- 2) Boshini orqaga engashtirish.
- 3) Pastki jag`ini oldinga va yuqori surish va og`zini ochish.
- 4) Og`iz va tomoqni shilimshiq va boshqalardan tozalash.
- 5) Bemorni og`ziga havo yuborib, ko`krak qafasi ekskursiyasi va nafas chiqarishni kuzatib turish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://uz.wikipedia.org/>
2. <https://fayllar.org/>
3. <http://srcyrl.emssabc.net/info>