

Proceedings of International Educators Conference

Hosted online from Rome, Italy.

Date: 25th July, 2023

ISSN: 2835-396X

Website: econferenceseries.com

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С РЕВМАТОИДНЫМИ АРТРИТАМИ ОСЛОЖНЕННОЙ С НПВС-ГАСТРОПАТИЯМИ С ИНГИБИТОРАМИ ПРОТОННОГО КАНАЛА

Хамидова Гулноз Сайфиддиновна

Ассистент кафедры «Внутренних болезней, реабилитологии и народной
медицины» Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии,
Республика Узбекистан. Город Ургенч

Юлдашева Гулноза Зокир кизи

Терапевт семейной поликлиники №59 янгиарикского ЦРБ

Введение:

Распространённость РА среди взрослого населения в разных географических зонах мира колеблется от 0,5 до 2% .РА страдает около 0,61% от общей популяции НПВП-наболее широко используемой в клинической практике и повседневной жизни класс лекарственных средств. **Целью нашего исследования** являлась изучение эффективности препаратов мовалис и пантопразола, эффективность их взаимосвязи с клиническими проявлениями НПВП-гастропатии. **Материалы и методы:** Было обследовано 40 больных, у которых имелся достоверный РА, со средней степенью активности.Средний возраст больных составил 39+ 16,1 года. Патологию со стороны ЖКТ выявляли тщательным клиническим обследованием. Всем больным проводили эндоскопическое исследование.Больные были распределены на 2 группы. 1) 20 больных (1группа) получавшие Нимесулид-АТМ в дозе 100мг/сут в течении года с перерывами в период ремиссии 2) Мовалис –в дозе 15мг/сут 15 дней и пантопразол 40 мг\сут .Из 40 обследуемых больных РА 33 жаловались на боли эпигастральной области, у 19 обнаружен диспепсический синдром. При ФЭГДС При фиброэзофагогастродуоденоскопии (ФЭГДС) эрозивные поражения слизистой оболочки желудка обнаружены у 12 (60%) больных 1 -й группы и у 9 (45%) больных 2-й группы; эзофагит обнаружен у 10 (50%) больных 1-й группы и у 8 (40%) больных 2-й группы.Мы выбрали препарата для терапии НПВП-индуцированных гастропатий, **пантопразола**, по 20 мг 2 раза в сутки , , кларитрамицина (макролид)500 мг 2 раза в сутки и ампициллина 500 мг 2 раза в сутки эффективно влияло на язвы желудка.



Proceedings of International Educators Conference

Hosted online from Rome, Italy.

Date: 25th July, 2023

ISSN: 2835-396X

Website: econferenceseries.com

Результаты: 1. Сравнительная частота встречаемости НПВП-гастропатии у больных РА в зависимости от приёма неселективных и селективных нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) позволили установить преимущество Мовалиса в сравнении Нимесулидом. 2.

Обсуждения: Таким образом, можно утверждать, что препараты **мовалис** и **пантопразол** в суточной дозе 40 мг является безопасным и высокоэффективным препаратом выбора для профилактики и терапии гастропатий и эрозивно-язвенных изменений, вызванных приемом НПВП, в том числе у пожилых пациентов с сопутствующими заболеваниями, требующими медикаментозного лечения.



E- Conference Series

Open Access | Peer Reviewed | Conference Proceedings



E- CONFERENCE
SERIES