

Proceedings of International Educators Conference

Hosted online from Rome, Italy.

Date: 25th August, 2023

ISSN: 2835-396X

Website: econferenceseries.com

EXPERIMENTAL VA MORPHOLOGIC TADQIQOTLAR

Yaminova N.X.,

Mamasoliev N.S.,

Tursunov X.X.

Andijon davlat tibbiyot instituti

Bugungi dunoda kwp mamlakatlarda aholining noironligi wa limning bosh kasalliklaridan biri miokard infarksiyasi.

Ayollarda bilan kasallanishni “zh nuktasi” 5 yosh va undan yukori av6, ammo tugri keladi, lekin MI ancha yosh ayollarni ham hastalai boshlady. Chunonchi, 6707 ta tadqiq qilinuvchilar ishtiroki bilan Parisda ST segmenti kwtarilishi bilan miokard infarkti (STKBMI) ifodalanadi kwp markasli registr tuzilgan va unda ayollar o'rganilgan. But tadkotda 60 kasallik ayollarga STKBMINning aniqlanishi chastotasi ikki barobarga ko'payganliga kayd kilingan.

V.V.Cherepanova, V.G.Putnyaga (2016) Ularning xarididan kelib chiqib muhim hulosani takdim etishgan: ayollar (estrogenlar himoyasida) bulishadi va shunga qaramasdan zamonaviy YuIK, zhumladan, MI ham, khayz faoliati saklanib turgan ayollarni ham ayamai qo'ygan. Bu holatni ifodalash uchun L.A. Emelyanova hammualifar 11 (2000) tomonidan “Ertaki YuIK” amaliyotga” yordam .

Ammo, ushbu Phenomenning kelib chiqish sabablari va clinic kechishi xususiyлари ayollard khanuzgacha ishlab chiqarish o'rganilmagan.

Shu nuqtai nazardan D.M. Seliverstov va hammullifar (2019) tomonidan hayotga ta'sir qilgan ayollarda Mining clinics tasvirini o'rganishga bag'ishlagan tadqiq e'tiborini tortadi.

Muallilar retrospective tadqiqot davomidi 31 ta MI holatini ayollarda tahlil qilingan, shulardan 66 tasi haiz faoliyati saklagan ayollar bushgan. Uch har ikkala guruhda ham art hypertisi va ortik tana vazni eng ko'p tarqalgan xatorni bushishgan. Shu bilan birga irsiy mumkinlik va chekish ham hayz saklangan bemorlarga nisbatan qo'p uchrashgan. Ikki gurudagi ayollarda yana birdai bwlib Q-izhoby (QpMI) va oldingi zhoylashuvli kiyim kayd qilingan. Hayz faoliati saklagan ayollar MI aksariati YIKning birinchi kwlanishi bulgan va kwpincha ertangi postinfarction angina pectoris bilan asoratlangan, ammo shu bilan bir vaktda, HADS malumoti bSyicha sub clinic namoenlashgan “talvasaga tushish” juda kam kuzatilgan .

O.M. Maslenkova va hammullifar (2019) zhamoasi birgalikda perkutan coronar aralashuv (PKA) bazharilgan o'tir myocardial infarctions (OMI) bilan bemorlarni



Proceedings of International Educators Conference

Hosted online from Rome, Italy.

Date: 25th August, 2023

ISSN: 2835-396X

Website: econferenceseries.com

davolash tazhibasi tahlil chilib chikilgan va umumiylashtirilgan 158 ta O'MI bilan bemorni clinic manza rasi tadqiq qilingan. PKAning turli muddatlarini davolashda samaraligini isbotlangan. Khusu, PKAni MI kunida birinchi 48 soatda bazharish (tugallangan MI) ulim kursatkichlarini konservativ davo guruhidagi bemorlarda ancha past bulishi kuzatilgan. PKAni boshlagan birinchi 6 soat muddatida bazharilishi (rivozhlanayotgan MI) Mining ishlashini keskin kamay. MI bilan bemorlarni rehabilitationini PKA birinchi sutkasida o'tkazgan bemorlarda 3.2 barovar va 24-48 soat davomida bazharilganlarda esa 1.6 barovarga konservativ amaliyot bilan olib borilgan bemorlarga qaraganda yukori bulgan.

MI muammosi kasallanishni yukseligi va ulim suratlarini boglik bulib saklanib kolmoqda. Mizhozlarni olib borish buyicha har kunli yangi tavsiyalar chikadi (201-Russia cardiologist zhamiyati - RKO tavsiyalar, 2017 - Europe cardiologist zhamiyati - EoR tavsiyalar) kilgan yangi belgilar taqdim etylgan.

MI bilan kasallanganda davolash va shoshilinch prevention strategiyasi and necrosis of hududini kengayishiga (clinic va yashirin ifodalangan soatlarda) - birinchi 72 soat davomid kasalligini recurlanishiga (72 soatdan keyin) qarashilishi kerak buladi.

Kasallik tacticasi va xamda siffokorni mazhburiyati, demak, ainan, bu MINing epidemiologist va pathogenetic yullariga yuilsa mumkin bo'ladi. Bu holatdagi epidemiologist tadqiyotlarni, shu bilan birga, yordam bazharilmaganliga ham urgu berib o'tish kerak b'ladi.

Eksperimental va morfologik kuyidagilar tasdiklab barilgan: myocardium transporti ishchemiasi boshidan 15-20 daqiqa o'tib kelib chikadi va shu undan keyin soat orkaga qaytarilib b' Ulmaidi, bundan keyin MI shu vaqtgacha shikastlangan kardiomyo soatlari. ilib kolishi mumkin b'ladi yoki b'lib o'tayotgan o'zgarishlarni repressioniga umid settle down. 6 soatdan keyin yuksorida ko'rsa ishlab chiqarish, nekrozning mumkin bulgan eng katta o'chog'i shakllanib jami shikast yogan myocard hzhairalari o'ladi. Bu-muvaffaqiyatli (invaziv vanoinvasive yul bilan) coronar kon oqishini tiklab olish uchun imkoniyat vaktidir.

Umuman, MI va komorbidlik masalasida ma'lum darazada noaniqliklar saklanib kolgan va bozor zid ma'lumotlarga anilik kiritish zaruriyati, ainixa epidemiologist tadqiqotlar o'tkazish yo'li bilan mavzhud. Khuddi shundai khulosa Mining xator sifatiga nibatan va asoratlanishi mumkin yoki fayl MINI kelib chiqishi, kechishidan rollariniam tadqiqotlarda turlicha gapiradi.



Proceedings of International Educators Conference

Hosted online from Rome, Italy.

Date: 25th August, 2023

ISSN: 2835-396X

Website: econferenceseries.com

Foidalanilgan adabiyotlar.

1. N.S. Mamasaliev , M.A. Kachkovskiy , Z.N. Mamasaliev [va boshqalar] // " Reaviz " tibbiyot instituti xabarnomasi : reabilitatsiya, shifokor va salomatlik. - 2018. - V. 35-son, 5-son. - S. 26-32.
2. Mamasaliev , N.S. O'zbekistonda o'tkir koronar sindrom: dunyoning boshqa mamlakatlaridagi ma'lumotlar bilan solishtirganda Andijon reestrida aniqlangan tashxis, davolash va oldini olishning o'ziga xos xususiyatlari / N.S. Mamasaliev ,
3. M.A. Kachkovskiy , Z.N. Mamasaliev [va boshqalar] // " Reaviz " tibbiyot instituti xabarnomasi : reabilitatsiya, shifokor va salomatlik. - 2018. - V. 35-son, 5-son. - S. 32-40.
4. Miklishanskaya , S.V. Semirib ketish va uning yurakning tuzilishi va faoliyatiga salbiy ta'sir qilish mexanizmi / S.V. Miklishanskaya , L.V. Solomasova , N.A. Mazur // Kardiologiyada ratsional farmakoterapiya. - 2020. - T. 16, 1-son. - S. 108-117.