

НЕОБОСНОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ АНТИБИОТИКОВ ПРИ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА

Бойматова Наргиза Панжи кизи

Бухарский государственный медицинский институт, г. Бухара, Узбекистан

boymatovanargiza93@gmail.com

Актуальность:

Необоснованное применение антибиотиков при острых респираторных заболеваниях (ОРЗ) у детей младшего возраста – серьезная проблема, угрожающая здоровью как отдельного ребенка, так и общественному здравоохранению в целом. Часто родители, а иногда и врачи, ошибочно полагают, что антибиотики – панацея от любого заболевания, сопровождающегося кашлем, насморком и высокой температурой. Однако большинство ОРЗ вызываются вирусами, на которые антибиотики попросту не действуют. Назначение антибактериальных препаратов в таких случаях не только бесполезно, но и крайне опасно.

Цель исследования- Выяснить, ожидали ли родители опекуны, сопровождающие детей, назначение врачом антибиотиков? Целью этого обзора является не осуждение деятельности практикующих врачей амбулаторного звена, а призывает к более внимательному изучению анамнеза, проведению всех дополнительных исследований для получения полной картины болезни. Правильное обследование помогает определить целесообразность назначения антибиотикотерапии, а если она необходима - выбрать эффективное средство.

Методы и материалы исследования: Анкетирование. На основе перечня вопросов определить частоту встречаемости ОРЗ у детей младшего возраста. Под наблюдением было охвачено 30 детей раннего возраста, находящиеся в отделении болезней детей раннего возраста. Перечень вопросов прилагается в очном докладе.



Результаты исследования:

Исходя из данных, полученных при опросе, были выявлены следующие результаты: Средняя частота заболеваемости детей в год составляет: среди мальчиков 12-14 раз в год; среди девочек 8-10 раз в год. Процентное соотношение, исследованных девочек и мальчиков составляет 47%/ 53%. Частота встречаемости: Пневмонии 40% ;болей в ушах 40%; гной в горле 20%; Витамин Д получают 60.6% детей. Прием антибиотиков у 17% лиц назначаются фармацевтом, 3% лечат самовольно, 66% врачом, 14% родителей прислушиваются к советам соседей, друзей и родственников, все ответы были выбраны 13% родителей; у 57% детей имеются признаки рахита; У 30% детей имеются признаки БЭН; у 47% детей низкий показатель гемоглобина; диарея наблюдалась у 47% детей; до двух лет кормление исключительно грудным молоком у 23%; Питание исключительно смесью у 27% детей; у 100% родителей была ситуация, когда фармацевт предлагал заменяющие антибиотики; 93% детей принимают антибиотики каждый раз при ОРЗ.

Выводы:

1. В амбулаторных условиях наиболее частой причиной назначения антибиотиков у детей является ринофарингит как осложненный, так и неосложненный; основными препаратами назначаемыми врачами-педиатрами детям на амбулаторном этапе являются цефалоспорины; всего лишь 7% детей не принимали антибиотики при ОРЗ

Заключение: врачи и другие медицинские работники нуждаются в обучении по рациональному назначению антибиотиков и внедрении основанных на фактических данных стандартных руководств по лечению, чтобы уменьшить надлежащее использование антибиотиков у детей с само излечивающимися инфекциями верхних дыхательных путей.

Литература

1. qizi Nurilloeva S. N. OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE AND CHANGES IN MENTAL STATUS IN PATIENTS WITH COVID-19 //THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD. – 2022. – Т. 1.

– №. 3. – C. 91-97.

2. Kizi N. S. N. Assessment of the methods of the state of hyperglycemia at different body masses //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 9. – C. 359-366.

3. Nurilloeva S. N. PREVENTION OF OBESITY AND OVERWEIGHT IN PATIENTS WITH VARIOUS DEGREES OF HYPERGLYCEMIA //INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE. – 2022. – T. 1. – №. 7. – C. 74-81.

4. Badritdinova M. HN., Bozorova HN. Z.. Frequency Of Occurrence Of Hyperlipidemia Among The Female Population / / AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI. - 2022. - Vol. 1. - No. 1. - Pp. 6-10.

5. Orziev Z. M., Nurilloeva Sh. N. Competence of quantitative indicators of leading clinical signs of cholestasis in the differentiation of its gradations. 2018, no. 4, pp. 62-73

6. qizi Nurilloeva, S. N. (2022). OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE AND CHANGES IN MENTAL STATUS IN PATIENTS WITH COVID-19. THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD, 1(3), 91-97.

7. qizi Nurilloeva, Shahodat Nurillo. "OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE AND CHANGES IN MENTAL STATUS IN PATIENTS WITH COVID-19." THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD 1.3 (2022): 91-97.

8. Nurillokizi N. S. Metabolic Syndrome: Methods of Prevention and Treatment //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2021. – T. 1. – №. 6. – C. 475-482.

9. qizi Nurilloeva S. N. OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE AND CHANGES IN MENTAL STATUS IN PATIENTS WITH COVID-19 //THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD. – 2022. – T. 1. – №. 3. – C. 91-97.

10. Nurilloeva Shakhodat Nurillo kizi. Diagnosis of Tubuloglomerular Relationship in Patients with Metabolic Syndrome // Journal of advanced research and stability (JARS) Volume: 01 Issue: 06 | 2021 ISSN: 2181-2608. –P. 469-474.

